

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-9-80371885

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée - 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)
B.P. n° 19

ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

- BULLETIN TECHNIQUE n° 176 (22ème envoi de 1980) -

23 septembre 1980

/ ARBRES A FRUITS A PEPINS /

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER SUR POMMES, POIRES ET COINGS

Cet insecte demeure très actif et le quatrième vol de papillons présente une certaine importance. Des oeufs sont déposés chaque jour. Dans les vergers de fruits à pépins tardifs situés à proximité de vergers de pêchers contaminés ou proches d'agglomérations (villes, villages), il est prudent d'effectuer un nouveau traitement en veillant au respect des délais de carence des produits utilisés (intervalle entre l'application et la cueillette).

SESIE DU POMMIER (*Synanthedon myopiformis*)

La chenille de ce papillon creuse des galeries, d'abord dans l'écorce puis dans le jeune bois sous l'écorce. Actuellement, elle peut être atteinte en employant un produit à base de dichlorvos (nombreuses spécialités) à la dose de 200 g de matière active à l'hectolitre d'eau. Pour que ce traitement soit efficace, il est nécessaire de mouiller abondamment le tronc et les charpentières.

Rappelons que les attaques se produisent principalement au niveau des blessures : surgreffage, grosses plaies de taille, chancres divers.

Traiter dès que la récolte est enlevée.

/ VIGNE /

POURRITURE GRISE (*Botrytis cinerea*)

Le climat est assez favorable au développement de cette maladie.

Dans les vignes sensibles, notamment si l'on observe la présence de grappes attaquées, il est conseillé d'appliquer un dernier traitement en respectant les délais d'emplois des produits utilisés :

- 21 jours pour procymidone (SUMISCLEX) et vinchlozoline (RONILAN),
- 15 jours pour iprodione (ROVRAL).

TORDEUSE DE LA GRAPPE (*Eudemis*)

Dans le Nairannais et dans l'Armagnac, le troisième vol d'eudemis est très faible. Néanmoins, dans les parcelles qui ont subi des attaques sensibles au cours de la seconde génération, ajouter au traitement anti-botrytis un insecticide ; de préférence du type parathion ou méthomyl.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : J. THIAULT.-

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.

P231